

ANTICERUMEN® LIADE

LAURILSULFATO DE SODIO

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

Laurilsulfato de sodio .. 50 mg

Excipientes: Clorobutanol, p-diclorobenceno, benzocaína, urea, esencia de trementina, polisorbato 80, propilenglicol c.s.

PROPIEDADES

El laurilsulfato sódico es un agente humectante con propiedades detergentes y reblandecientes que actúan sobre el cerumen facilitando su extracción.

INDICACIONES

Cuando el exceso de cerumen en el conducto auditivo externo ocasiona mani- festaciones tales como audición disminuida, zumbido de oídos, escozor, etc.

POSOLOGÍA

Uso tópico

Instilar 4-5 gotas en el conducto auditivo afectado, tapar con una torunda de algodón y esperar media hora, luego irrigar suavemente el oído con agua caliente, utilizando una jeringa ótica o de goma.

ADVERTENCIAS

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento contiene urea como excipiente por lo que puede producir irritación en la piel.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

No utilizar en caso de perforación de tímpano.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Frasco con 10 ml.

SIN RECETA MÉDICA.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT srl Via Cavour, 70 - Mede (PV) -
Italia

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios