

# BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ

## COMPOSICION:

Bicarbonato sódico puro 500 mg, por comprimido. Excipientes: Celulosa microcristalina, Talco.

## PROPIEDADES:

El Bicarbonato sódico es un antiácido con actividad neutralizante del exceso de ácido en el estómago.

## TITULAR Y FABRICANTE:

### Titular:

Novartis Consumer Health S.A.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona-España

### Fabricado por:

Novartis Farmacéutica S.A.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona-España

## INDICACIONES:

Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con hiperacidez (acidez de estómago, ardores).

## POSOLOGIA:

Adultos: De dos a cuatro comprimidos tomados con un poco de agua de 20 minutos a 1 hora después de las principales comidas. No tomar más de 2 dosis al día. Niños: Consultar al médico

## CONTRAINDICACIONES:

Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, está embarazada, tiene propensión a la retención de agua (edemas), o en general, si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o una dieta con poca sal.

## EFFECTOS SECUNDARIOS:

Riesgo de retención de agua (edema). Flatulencia y eructos.

## INTERACCIONES:

Consulte a su médico si se encuentra tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden modificar la acción de otros medicamentos (tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

No utilizarlo más de 2 semanas sin consultar al médico.

### Advertencias sobre excipientes

Este medicamento por contener 137 mg de sodio por comprimidos, puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

## IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

## SINTOMATOLOGIA DE INTOXICACION Y TRATAMIENTO:

A grandes dosis o tratamientos continuados: Alcalosis metabólica, que se manifiesta con los siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, vómitos, pérdida de apetito. Interrumpir la medicación y consultar al médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica (Teléfono: 91-562.04.20) indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Vía oral

“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños”.

Sin receta médica.

Protéjase de la humedad.