

ISOPTO B 12 0.5 MG/ML COLIRIO 1 FRASCO SOLUCION 5 ML

Indicaciones

- Tratamiento de la fragilidad del epitelio corneal.
- [ULCERA CORNEAL] recidivante.
- Erosiones, heridas y úlceras corneales.
- Procesos de reepitelización corneal.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- [QUEMADURAS] oculares de origen químico o físico.
- Extracción de cuerpos extraños intraoculares.

Posología

- Adultos y niños, tópica oftálmica: Instilar 1-2 gotas 3-6 veces al día.

Precauciones

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:

- Este medicamento contiene tiomersal, por lo que puede provocar reacciones alérgicas.

Embarazo

No se han llevado a cabo estudios específicos en embarazadas, no obstante, dada la ausencia de toxicidad del producto, no se esperan efectos adversos.

Lactancia

No se han llevado a cabo estudios específicos en madres lactantes, no obstante, dada la ausencia de toxicidad del producto, no se esperan efectos adversos.

Niños

No se han descrito problemas específicamente pediátricos en este grupo de edad. Uso aceptado.

Ancianos

No se han descrito problemas específicamente geriátricos en este grupo de edad. Uso aceptado.

principiosActivos:

Principios activos

- **Cianocobalamina (oftal):**0.5 mg.
- **Tiomersal (excipiente):**0.1 mg.

laboratorio:

Alcon cusi

tipo:

Otros oftalmológicos

grupo:

Tónicos oculares