

## **CASENFILUS**

### LATOBACILOS ACIDÓFILOS

**COMPOSICIÓN:** Cada sobre contiene: Lactobacilos acidófilos, 240 millones. Excipientes: Lactosa 1,6g. Sacarina sódica. Leche en polvo desnatada, y Vainillina, c.s.

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:** CASENFILUS: Envase con 10 sobres de 2g cada uno.

**ACTIVIDAD:** La alteración o desaparición de la flora acidófila intestinal normal, que ocurre en el curso de enfermedades gastroentéricas o durante el tratamiento con antibióticos se manifiesta por síntomas variados que responden a la reposición de la misma. Casenfilus restaura la flora intestinal porque contiene, en forma liofilizada, el elemento necesario. Lactobacilos acidófilos, huésped habitual del intestino humano.

**TITULAR-FABRICANTE:** Laboratorios Casen Fleet. Autovía de Logroño km 13,300. 50180 Utebo (Zaragoza).

**INDICACIONES:** Tratamiento sintomático de los procesos diarreicos agudos o repentinos. Prevención y tratamiento de las diarreas producidas por la administración de antibióticos

**CONTRAINDICACIONES:** No se han descrito

**INTERACCIONES:** No se conocen.

**ADVERTENCIAS:** No usar durante más de 2 días o con fiebre alta o en niños menores de 3 años sin consultar con el médico. Embarazo: Si está Vd. Embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. Uso en niños: menos de 3 años, consultar a su médico. Advertencia sobre excipientes. Este medicamento contiene 1,6g de lactosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa a galactosa, galactosemia o insuficiencia en lactosa.

**POSOLOGÍA:** Adultos: De 6 a 9 sobres al día. Niños: De 3 a 6 sobres al día.

**NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN:** El producto se mezclará, preferentemente, con pequeñas cantidades de leche o agua fría.

**SOBREDOSIS Y SU TRATAMIENTO:** No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**REACCIONES ADVERSAS:** No se ha descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico o a su farmacéutico.

**CONSERVACIÓN:** Conservar en frigorífico entre 2º y 8º C. No congelar.

**CADUCIDAD:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

**SIN RECETA MÉDICA.**

**Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**