



**nani predental**  
(Benzocaína)

**NUEVA FÓRMULA**

**COMPOSICIÓN**

Cada 100 g del gel contienen:

Benzocaína (D.C.I.) ..... 5 g  
Excipientes (propilenglicol, hidroxietilcelulosa, ciclamato sódico, manitol, esencia de anís verde y esencia de fresa) ..... c.s.

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Gel gingival. Envase con un tubo de 10 g con sabor a fresa-anís.

**ACTIVIDAD**

**nani predental** contiene Benzocaína, un anestésico local útil para combatir de forma inmediata el dolor cuando se aplica externamente sobre la mucosa oral.

**TITULAR Y FABRICANTE**

LABORATORIOS ALTER, S.A. - Mateo Inurria, 30 - 28036 MADRID.

**INDICACIONES**

Alivio local sintomático de las molestias de las encías originadas por la aparición de los primeros dientes.

**CONTRAINDICACIONES**

No aplicar en caso de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos locales, o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

No utilizar en niños menores de 4 meses.

**PRECAUCIONES**

Aplicar este producto exclusivamente sobre las encías.

En caso de que los síntomas empeoren o continúen tras 7 días de tratamiento, interrúmpalo y consulte a su médico.

**INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES**

La Benzocaína no debe utilizarse conjuntamente con medicamentos como las sulfamidas e inhibidores de la colinesterasa.

Si está utilizando algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

## **ADVERTENCIAS**

### **Embarazo y lactancia**

No se puede utilizar este medicamento en estos casos.

### **Efectos sobre la capacidad de conducción**

No se han descrito.

### **Uso en niños**

Contraindicado en niños menores de 4 meses.

### **Deportistas**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico del control del dopaje como positivo.

## **POSOLOGÍA**

La aplicación es exclusivamente sobre las encías.

Niños mayores de 4 meses:

Aplíquese 3-4 veces al día siguiendo las “Instrucciones para la correcta administración del preparado”.

No aplicar este medicamento más veces de las recomendadas ni más de 7 días seguidos.

## **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

Para exclusiva aplicación sobre las encías.

Lavarse las manos antes de aplicar el preparado. Poner sobre el dedo o una gasa limpios una pequeña cantidad de gel, equivalente a un grano de arroz y aplicar sobre la encía del niño, en los puntos de erupción o dolor, hasta 3-4 veces al día.

## **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562 0420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

## **REACCIONES ADVERSAS**

En casos de reacciones alérgicas al preparado, pueden aparecer erupciones en la piel. Suspenda su utilización y acuda a su médico.

Si se observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## **CONSERVACIÓN**

Conservar en lugar fresco y seco.

## **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**TEXTO REVISADO:** Noviembre 1999.



2359911

NOTA: Las palabras “NUEVA FÓRMULA” figurarán durante un año a partir de la autorización.

El tamaño de la letra tendrá un cuerpo 7, como mínimo