SARGISTHENE® 1 g solución oral

ASPARTATO DE ARGININA

COMPOSICIÓN por ampolla bebible de 5 ml:

L-aspartato de L-arginina,1 g; sacarosa, 1 g; aroma de albaricoque; caramelo líquido, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo; agua c.s.p. 5 ml.

ACTIVIDAD

La molécula de L-Aspartato de L-Arginina contribuye a la biosíntesis de proteínas.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático en:

- Situaciones de cansancio o fatiga física en general debido a un insuficiente aporte proteico, así como en períodos de convalecencia que cursen con fatiga física o psíquica.

- Prevención de los estados carenciales de aminoácidos por ingestión insuficiente de proteínas debido a regímenes dietéticos o falta de apetito.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES

Por su contenido en Arginina, las personas con retención urinaria solo lo tomarán bajo vigilancia médica.

INTERACCIONES

No se conocen entre el Aspartato de Arginina y cualquier otro medicamento.

ADVERTENCIAS

Uso en embarazo y lactancia:

Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este

medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto.

Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.

POSOLOGÍA

Adultos: 3 ampollas al día, distribuidas en las principales comidas, con un poco de agua.

Niños mayores de 3 años: 1/2 a 2 ampollas al día distribuidas de la misma manera.

Duración del tratamiento: 2 semanas, salvo prescripción facultativa. En caso de persistencia de los síntomas consultar al médico.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Modo de abrir las ampollas de doble punta:

1º Las ampollas de SARGISTHENE® son autorrompibles, ver fig. 1.

2º Coger la ampolla entre el pulgar y el índice y con un movimiento seco provocar la ruptura, ver figs. 2 y 3.

3º Repetir la operación anterior para abrir el otro extremo de la ampolla, tomando la precaución de poner el extremo ya abierto dentro de un vaso para recoger la solución, ver fig. 4.

< Dibujos representativos del modo de abrir las ampollas >

SOBREDOSIS:

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN: Condiciones normales

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 ampollas bebibles de 5 ml/ampolla.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. SIN RECETA MÉDICA

MEDA Pharma, S.A.U.

Av. Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando (Edif. Berlín) 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios