

## PROSPECTO DE SORBENOR Sol. oral 1 g (Solución oral)

### SORBENOR<sup>®</sup> Aspartato de Arginina

**COMPOSICIÓN** Cada ampolla bebible de 5 ml contiene:

Aspartato de arginina ..... 1 g

Excipientes:

Sacarosa ..... 1 g

Nipagín, nipasol, esencia de albaricoque y agua desionizada c.s.p..... 5 ml

### FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Estuche conteniendo 20 ampollas de 5 ml de solución bebible.

### ACTIVIDAD

El principio activo de la especialidad **Sorbenor<sup>®</sup>, aspartato de arginina**, contribuye a la biosíntesis de proteínas.

### TITULAR

Laboratorios Casen-Fleet, S.L.U. Utebo (Zaragoza)

**FABRICANTE** MEDA Manufacturing Mérignac (Francia)

### INDICACIONES

Tratamiento sintomático de los estados de cansancio, fatiga y convalecencia debidos a un insuficiente aporte de proteínas.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

### PRECAUCIONES

Por su contenido en arginina, las personas con retención urinaria solo lo tomarán bajo vigilancia médica.

### INTERACCIONES

No se han descrito.

### ADVERTENCIAS

Este medicamento contiene 1 g de sacarosa por ampolla, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

### Embarazo

#### IMPORTANTE:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

## **Lactancia**

No hay estudios sobre si el medicamento se excreta por la leche materna. En período de lactancia no deberá tomarse el producto sin consultar al médico.

## **Efectos sobre la capacidad de conducción**

No se han descrito.

## **Uso en niños**

Consultar al médico.

## **POSOLOGÍA**

### **Adultos**

2 a 4 ampollas bebidas, al día, en tratamientos mantenidos durante varias semanas, salvo prescripción facultativa.

### **Niños**

La dosis debe ser establecida por el médico según la indicación, edad y el peso del niño. Como norma general, de una a dos ampollas diarias bebidas antes de las comidas.

## **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

No es necesario el empleo de sierra, ya que son ampollas auto-rompibles, cuyas puntas se rompen fácilmente al hacer una pequeña tracción. Coger la ampolla por su cuerpo y con la otra mano abrir una de las puntas. Dar la vuelta a la ampolla, poniéndola sobre el vaso donde se va a tomar y abrir entonces la otra punta. El vaciado se producirá por sí solo al mantener la ampolla en posición vertical.

## **SOBREDOSIS**

Ante posibles signos de intoxicación por sobredosis o ingestión masiva se hará, si procede, lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información de Toxicología, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

## **REACCIONES ADVERSAS**

En algunos casos, reacciones alérgicas. Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa atribuable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

## **CONSERVACIÓN**

Condiciones normales. Temperatura ambiente. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

## **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**TEXTO REVISADO: SEPTIEMBRE 2012.**

## **SIN RECETA MÉDICA**

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L.U. UTEBO (Zaragoza)