FICHA TECNICA DE ACEITE DE RICINO ORRAVAN Sol. oleosa (Solución oral)

ACEITE DE RICINO ORRAVAN

COMPOSICIÓN

Aceite de Ricino ..... 25 g

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Forma líquida. Frasco 25 g.

ACTIVIDAD

Acción laxante y purgante.

TITULAR Y FABRICANTE

LABORATORIO FARMACEUTICO ORRAVAN, S.L.

Avda. Gran Capità, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

INDICACIONES

Necesidad de provocar el vaciado intestinal rápido (exploraciones radiológicas, cirugía intestinal, intoxicaciones alimentarias).

CONTRAINDICACIONES

- Sintomatología de apendicitis (náuseas, calambres, vómitos).
- Dolor abdominal no diagnosticado.

PRECAUCIONES

Tratamientos prolongados pueden producir tolerancia a la acción laxante y dependencia de éste para conseguir la evacuación.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

- Embarazo y lactancia: no se han descrito.
- Efectos sobre la capacidad de conducción: no se han descrito.

POSOLOGÍA

Forma líquida. Vía oral.

Adultos: 1-3 cucharadas soperas (15 cc) en una sola toma al día.

Niños mayores de 2 años: 1-3 cucharaditas (5 cc) en una sola toma al día. Niños menores de 2 años: 1 a 5 cc en una sola toma al día.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Administrar con leche, té, zumo de frutas, en ayunas.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis ó ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91- 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Calambres abdominales.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

En recipientes bien cerrados y protegidos de la luz.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios