

Antiverrugas ISDIN

Solución tópica

Composición


Cada 100 ml contienen	
Acido salicílico	16,7 g
Acido láctico	16,7 g
Colodión elástico c.s.p.	100 ml

Indicaciones


Tratamiento de las verrugas cutáneas.

Posología y modo de empleo

Una aplicación diaria. Antes de la aplicación del producto se aconseja frotar la superficie de la verruga con una lima.



Aplicar con la espátula una gota de antiverrugas ISDIN sobre la verruga a tratar, evitando tocar la zona de piel sana circundante ya que se producirían quemaduras, proteger esta zona con una pomada o crema oleosa (vaselina...).



Dejar secar y recubrir con un esparadráp durante 12 horas. Repetir la operación hasta la total desaparición de la verruga.



Contraindicaciones

Alergia a alguno de los componentes.
No utilizar en pacientes con Diabetes Mellitus o con problemas de circulación periférica.

Interacciones

Dada la acción queratolítica del producto, no debe aplicarse conjuntamente con otro queratolítico para no aumentar la capacidad cáustica de sus componentes activos.

Efectos secundarios

Puede producir enrojecimiento de las zonas adyacentes.

Advertencias

Alejarlo de los ojos. Sólo para uso externo. No ingerir. Muy inflamable. Evitar fumar durante su aplicación. Manténgase el frasco bien cerrado.

Precauciones

Evitar el contacto del producto con la piel o las mucosas. Aclarar con agua si el líquido entra en contacto con la piel que no ha de ser tratada. No aplicar si la piel está inflamada, enrojecida, infectada, levantada o herida.

Antiverrugas ISDIN

Consultar al médico si las verrugas son abundantes o si se produce infección o inflamación. Aunque puedan ser necesarias 12 semanas de tratamiento, consultar al médico si no se nota mejoría después de 2 semanas.

Intoxicación y su tratamiento

En el caso de ingestión accidental por vía oral se administrarán líquidos, preferentemente leche, para diluir su acción corrosiva. Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, para que procedan a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzgan necesario. Consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20

Presentación Solución tópica
Frasco de 20 ml.

Composición
Cada 100 ml de solución contiene: Ácido salicílico 10 g. Alcohol 90 g.

Sin receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

DA1493-8976

Indicaciones y modo de empleo
Una aplicación diaria sobre la zona de aplicación del producto se recomienda.

Fabricado por:
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
(Martorellas)-Barcelona.

Laboratorios ISDIN, S.A.
Diagonal, 520 - 08006 Barcelona

Aplicar con la espátula las gotas de Antiverrugas ISDIN sobre la zona de la lesión, evitando tocar la zona de piel sana. Continuar la aplicación ya que se producen descamaciones, proteger esta zona con una compresa o crema oleosa (Vaseline).



Dejar secar y repetir con una compresa durante 15 horas. Repetir la operación hasta la desaparición de la lesión.

Efectos secundarios
Puede producirse irritación de la zona tratada.

Contraindicaciones
Alérgico a los componentes. No usar en caso de infección, inflamación o lesión de la piel.

Precauciones
Evitar el contacto con la zona sana. Evitar el uso prolongado. Evitar el uso en zonas de piel sensible. Evitar el uso en zonas de piel lesionada.