

## **BETATUL®**

Apósito de uso tópico

Apósitos de tul malla hidrófila de 10x10 cm impregnados con un gel de Povidona iodada.

### **COMPOSICION por apósito:**

Povidona iodada, 0,250 g. Excipientes: polietilenglicol 400, 4000, 6000, agua.

### **ACCION FARMACOLOGICA:**

Antiséptico.

### **INDICACIONES:**

Está indicada como antisepsia cutánea en: quemaduras, heridas profundas, tratamiento complementario de úlceras (profundas, por decúbito, varicosas).

### **POSOLOGIA:**

Aplicación diaria o cada 2 días.

### **MODO DE EMPLEO:**

Abrir el sachet y quitar el plástico. Aplicar sobre la herida la compresa impregnada. Recubrir con una gasa o algodón. Sujetar por medio de una venda.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No debe ser aplicada a enfermos que presentan intolerancia al yodo.

### **INCOMPATIBILIDAD y EFECTOS SECUNDARIOS:**

No debe utilizarse al mismo tiempo derivados mercuriales. En los raros casos en que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse el tratamiento.

### **INTOXICACION y SU TRATAMIENTO:**

Lavado de la zona lesionada y aplicación de antiinflamatorios, incluyendo los corticoides.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20.

### **PRESENTACION y PVP (IVA 4):**

Envase con 10 sachets de 1 apósito, 9,99 €

**CONDICIONES DE DISPENSACIÓN:** Sin receta médica. Especialidad Farmacéutica Publicitaria

**Meda Pharma, S.A.U.**

Av. Castilla, 2 (Parque Empresarial San Fernando).

28830 San Fernando de Henares (Madrid)

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**