

® DACROLUX
Lágrimas artificiales

COMPOSICIÓN.- Cada ml contiene 3 mg de hipromelosa y 1 mg de dextrano-70.
Excipientes: cloruro de benzalconio, fosfato monosódico, fosfato disódico, cloruro potásico, cloruro sódico, edetato disódico, polisorbato 80 y agua purificada.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE.- Solución oftálmica, envase con 10 ml.

ACTIVIDAD.- DACROLUX es una solución de baja viscosidad que imita los componentes de las lágrimas, estableciendo un adecuado grado de humectación y lubricación fisiológica sobre la superficie del ojo.

TITULAR - FABRICANTE

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona

INDICACIONES.- Este preparado está indicado en casos en que sea necesario una lubricación adicional como alivio sintomático de la sequedad de los ojos debida a utilización de lentes de contacto, molestias por polvo, contaminación etc.

CONTRAINDICACIONES.- Pacientes con alergia conocida a cualquier componente de la fórmula.

PRECAUCIONES.- Si aparece dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular continuada, o si los síntomas empeoran o persisten más de 3 días, consultar con el médico.

INTERACCIONES.- No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Advertencia sobre excipientes:

Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar de 10 a 15 minutos antes de volver a colocarse las lentes.

POSOLOGÍA.- Se instilarán 1 ó 2 gotas en cada ojo, tantas veces como sea necesario.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO.-

Con la cabeza inclinada hacia atrás, separar hacia abajo el párpado inferior y dejar caer las gotas en el saco conjuntival (espacio entre el ojo y el párpado), mientras se dirige la mirada hacia arriba. Cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados durante algunos segundos.

Antes de usar otras medicaciones oftálmicas, esperar como mínimo 5 minutos.

Recomendaciones para la utilización de colirios.- Por tratarse de un preparado estéril, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Cada paciente utilizará su propio envase.
- La aplicación del colirio deberá realizarse con la máxima higiene: limpieza de manos y evitando en lo posible cualquier contacto del goteador con alguna superficie (incluido el ojo).
- Después de cada aplicación, cerrar bien el envase.
- Finalizado el uso establecido deberá desecharse el resto del preparado aunque no se haya consumido en su totalidad.
- Desechar al mes de abierto el envase.

SOBREDOSIS.- Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS.- No se han descrito.

Si observa cualquier reacción adversa, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN.- No son necesarias condiciones especiales para su conservación.

CADUCIDAD.- No se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

TEXTO REVISADO.- Enero 1998

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona