


PUNTUALEX

Senósidos A + B (Sal cálcica)

Evacuante intestinal para Radiología y Rectoscopia



Planta de Sen (Cassia Senna)



TAMAÑO REAL
Unidosis 5 ml

- CORRECTA EFICACIA EVACUANTE
- UNIFORMIDAD DE RESPUESTA
- APTO PARA DIABÉTICOS
(no contiene glucosa ni azúcares).

- MUY BAJOS EFECTOS SECUNDARIOS
- BUENA TOLERANCIA
- FACILIDAD DE TOMA

FINANCIABLE EN CENTROS DE SALUD Y
HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Composición por 5 ml
Principio Activo:
Senósidos A + B, sal cálcica. 150 mg
Excipientes:
Glicerina c.s.p. 5 ml

FORMA FARMACÉUTICA

Solución.

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Vaciado de colon y recto, previo a intervención o a exploración médica: radiología, rectoscopia, colonoscopia.

Posología y forma de administración

Adultos: Dosis única: 5 ml (150 mg).
Niños: 2 gotas por Kg de peso corporal (3 mg/Kg).
En caso de pacientes débiles (geriátricos) la dosis puede separarse en 2 tomas. Ingerir la dosis disuelta en agua 12-14 horas antes del examen. A continuación beber agua en abundancia.

Contraindicaciones

Abdomen agudo, síntomas de apendicitis (náuseas, vómitos y calambres), obstrucción intestinal (íleo paralítico) hepatopatías graves, hemorragia rectal, embarazo y lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Seguir las recomendaciones del médico respecto a la dieta pobre en residuos que habrá de seguirse en los días previos al examen.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No debe tomarse al mismo tiempo que otros medicamentos, ya que puede impedir su absorción.

Embarazo y lactancia

No administrar a embarazadas o mujeres en período de lactancia.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

Ninguno.

Reacciones adversas

Dolor abdominal, retortijones, calambres musculares, coloración de la orina.

Sobredosificación

En caso de ingerir más de un frasco se producirá dolor abdominal, retortijones, calambres musculares, náuseas y vómitos.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas

Los senósidos A y B atraviesan el estómago y el intestino delgado sin absorberse ni metabolizarse gracias a su unión con la glucosa. Una vez en el colon los senósidos son hidrolizados por la flora bacteriana a la correspondiente aglicona, estimulando la motilidad intestinal y secundariamente disminuyendo la absorción de agua por el colon. A la dosis de empleo 150 mg los senósidos actúan como purgantes vaciando completamente el colon.

Propiedades farmacocinéticas

Los senósidos A y B atraviesan el estómago y el intestino delgado sin absorberse ni metabolizarse gracias a su unión al azúcar. Los microorganismos del colon rompen el enlace heterosídico separándose la senidina de las moléculas de glucosa. Las senidinas se metabolizan a reina y reina-9-antrona. Por las heces se eliminan senósidos A y B inalterados, senidinas A y B, reina-9-antrona y reina. Por la orina se eliminan las senidinas y la reina y sus productos de conjugación en el hígado: reina monosulfato y reina monoglucuronido.

Datos preclínicos sobre seguridad

No se han podido determinar las DL₅₀ de los senósidos A y B. A dosis altas se producen diarreas donde se elimina gran parte del

producto inalterado. Los senósidos A y B no son cancerígenos ni mutagénicos.

DATOS FARMACÉUTICOS

Relación de excipientes
Glicerina.

Incompatibilidades
Glucósidos cardiotónicos.

Periodo de validez

3 años.
Precauciones especiales de conservación Normales.

Naturaleza y contenido del recipiente
Envase de polietileno de alta densidad.
Contenido: 5 ml

Instrucciones de uso/manipulación
Ingerir el producto preferiblemente disuelto en agua.

PRESENTACION

Frasco unidosis 5 ml

SIN RECETA MEDICA

CÓDIGO NACIONAL: 997270



LAINCO, S.A.

Avda. Bizet, 8-12 - 08191 RUBÍ (Barcelona) - Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16 - E-mail: lainco@sefes.es - <http://www.lainco.es>